急性淋巴细胞白血病误为幼年特发性关节炎一例

孙玄静 张秀胜^(通讯作者)

南京中医药大学徐州附属医院(徐州市中医院), 江苏 徐州 221000

摘要: 儿童急性淋巴细胞白血病(acute lymphoblastic leukemia, ALL)是儿科常见的血液系统肿瘤,占<15岁的儿童期癌症的30%^[1],其特点为造血组织中幼稚淋巴细胞过度增生与分化成熟障碍,浸润到各组织和器官,典型的临床表现为发热、面色苍白、疲劳、淋巴结肿大、肝脾肿大、瘀斑瘀点等^[2],有典型临床表现的ALL诊断并不困难,而少数患儿首发症状不典型甚至无血液系统表现,则不易诊断^[3]。文献报道,15%-30%的ALL患者伴有肌肉骨骼系统的症状^[4],在有关节受累的儿童中,很少出现白血病的临床表现和实验室体征,因此,诊断延迟是未发生关节受累的儿童的两倍^[5]。以骨关节疼痛为首发症状的儿童ALL,早期易被误诊为幼年特发性关节炎(Juvenile idiopathic arthritis, JIA)或其他风湿系统疾病,本文报道1例以多关节肿痛起病,期间曾被误诊为JIA而予相关治疗,最终被确诊为ALL的病例,旨在加深临床医师对以多关节肿痛为首发症状的儿童ALL的认识,从而减少误诊漏诊。

关键词: 急性淋巴细胞白血病; 幼年特发性关节炎; 误诊漏诊

1 病例资料

患者,男,13岁,学生。因“多关节肿痛半月余”入住我风湿科。患者入院半月前无明显诱因出现右足跖趾关节2、3及右踝关节肿痛,未予治疗,4-5天后自行缓解。5天后再次出现多关节肿痛,累及左足跖趾关节2、左手掌指关节3、右腕关节,伴间断发热4-5天,体温波动在37.5-38.3℃,无寒战,无鼻塞流涕,无咳嗽咳痰,自服“布洛芬片、感冒药”等治疗(具体不详)。至外院查血常规:白细胞 $12.55 \times 10^9/L$,中性粒细胞计数 $10.72 \times 10^9/L$,血红蛋白132g/L,血小板 $397 \times 10^9/L$,Hs-CRP 39.04mg/L;尿常规:隐血±,尿红细胞35.2个/uL,红细胞(高倍)6/HPF;生化:球蛋白44.4g/L,LDL 3.19mmol/L;补体C4 0.575g/L,补体C3正常;尿微量白蛋白/尿肌酐、降钙素原、甲状腺功能、血清免疫固定电泳、抗核抗体谱、类风湿因子、抗链球菌溶血素O、抗CCP-Ab、抗双链DNA抗体、HLA-B27、尿免疫电泳、肿瘤标志物、结核感染T细胞检测、新型冠状病毒核酸检测、甲型/乙型流感病毒抗原检测、肝炎病毒、艾滋病毒抗体均未见明显异常;彩超:肝胆胰未见异常,脾稍大,双肾、输尿管、膀胱未见明显异常,甲状腺及引流区淋巴结未见明显异常;胸部+骶髂关节CT:两肺多发结节灶,右肺上叶混合密度结节,左肋骨内低密度影。外院诊断为“多关节炎”,予复方倍他米松注射液2.5mg肌注一次,枸地氯雷他定片、依托考昔片、泮托拉唑钠肠溶片口服治疗,洛索洛芬钠贴外治,患者关节肿痛无明显缓解,为求

进一步诊治入住我科。入院时:患者神清,精神尚可,左足跖趾关节2、左手掌指关节3、右腕关节肿痛,无发热,无盗汗,无乏力,无体重减轻,无皮疹,无口干眼干,无腰背疼痛,无腹痛腹泻,无尿频尿急尿痛,无粘液脓血便,纳可,睡眠一般,二便调。查体:T 36.5℃,BP 98/76mmHg, BMI 20.13kg/m²,咽部轻度充血,双侧扁桃体肿大,无淋巴结肿大,左足跖趾关节2、左手掌指关节3、右腕关节肿胀,压痛(+),局部皮温升高。双侧“4”字试验阴性。既往“慢性扁桃体肥大”史10年。入院查血常规:WBC $7.69 \times 10^9/L$, CRP 45.95mg/L, Hb 132.0g/L, PLT $214 \times 10^9/L$, RBC $5.02 \times 10^{12}/L$, N $5.37 \times 10^9/L$, ESR 87.00mm/h; PCT 0.05ng/ml,肝功能:ALP 158U/L, GLB 44.6g/L, UA 255umol/L。肾功能、电解质、心肌酶谱、空腹葡萄糖、抗链球菌溶血素O、RF、抗CCPAb、尿常规、尿蛋白/肌酐未见异常。凝血功能:PT 14.1s, F1 4.96g/L, D二聚体1.3mg/L,血脂:LDL 3.51mmol/L,淋巴细胞亚群:辅助/诱导T淋巴细胞546个/uL, NK淋巴细胞CD16+CD5 96个/uL,免疫功能测定:补体C3 1.92g/L,补体C4 0.54g/L, IgG 20.50g/L,免疫球蛋白K轻链5.11g/L, L轻链2.67g/L,粪便隐血阳性。诊断考虑“幼年型特发性关节炎”,治疗予甲泼尼龙40mg静滴qd抗炎7天,甲氨蝶呤10mg皮下注射qw抑制免疫,依那西普25mg皮下注射共两次。经治,患者多关节肿痛好转,血常规:HB 130.0g/L, Hs-CRP 4.61mg/L,血小板 $174 \times 10^9/L$;红细胞 $5.03 \times 10^{12}/L$,白细胞 $11.42 \times 10^9/L$,血沉65.00mm/h。

出院嘱甲氨蝶呤 4 片 qw, 依那西普 25mg 皮下注射 biw。出院后第 2 天患者出现发热伴咳嗽, 于当地医院诊断为“支原体感染”, 予输液治疗(具体药物不详)。5 天后多关节肿痛再次发作由急诊收住入院。入院时患者右手 MCPJ3-4、左膝、双踝、双腕关节肿胀压痛, 皮温升高, 无发热, 病程中无口干眼干, 无腰背疼痛, 无腹痛腹泻, 无尿频尿急尿痛, 无粘液脓血便, 无皮疹, 纳可, 睡眠一般, 二便调。查体: T 36.6℃, BP 104/59 mmHg, 咽部轻度充血, 双侧扁桃体显著肿大, 右手 MCPJ3-4、左膝、双踝、双腕关节肿胀, 压痛(+), 局部皮温升高。双侧“4”字试验阴性。辅助检查: 心电图示窦性心动过速; 血常规+超敏 C 反应蛋白: 淋巴细胞值 $4.14 \times 10^9/L$, 单核细胞值 $0.70 \times 10^9/L$, 中性粒细胞值 $9.82 \times 10^9/L$, 白细胞计数 $14.87 \times 10^9/L$; 胸部 CT: 右肺上叶小磨玻璃结节; CRP 44.90mg/L, ESR 62.00mm/h, PCT 0.07ng/ml; 血脂: TC 6.79mmol/L, LDL 4.25mmol/L, TG 1.04mmol/L; 葡萄糖 4.24mmol/L; 免疫功能: 补体 C3 2.05g/L, 补体 C4 0.50g/L, IgA 2.14g/L, IgG 17.40g/L, IgM 1.22g/L, 免疫球蛋白 K 轻链 3.79g/L, L 轻链 2.14g/L; 凝血五项: D-二聚体 1.23mg/L, 纤维蛋白原 5.48g/L; 叶酸 1.17ng/ml, 铁蛋白 75.1ng/mL, 维生素 B12: 311.6pg/ml; 呼吸道九联: 呼吸道合胞病毒 30.35AU/ml, 肺炎支原体 IgM 正常范围, 新型冠状病毒核酸检测阴性; 甲型、乙型流感病毒抗原检测阴性。尿常规、尿蛋白/肌酐, 粪常规+OB 未见明显异常。治疗予“甲泼尼龙 40mg 静滴 qd 抗炎共 10 天, 甲氨蝶呤 10mg 皮下注射 qw 抑制免疫, 依那西普 25mg 皮下注射共 3 次”。患者出院第 3 天在当地医院使用依那西普 25mg 皮下注射 1 次, 出院第 4 天再次发热伴多关节肿痛, 患者至当地儿童医院行骨髓形态学结果显示, 原始淋巴细胞增生活跃, 占有核细胞的 83%, 正常粒细胞、红细胞增生均受抑制, 免疫分型不详, 明确诊断为急性淋巴细胞白血病。

2 讨论及文献复习

白血病是最常见的儿童恶性疾病, 急性淋巴细胞白血病是最常见的亚型, 最高发病率在 2-6 岁之间, 三分之一的 ALL 患者最初表现为与肌肉骨骼系统^[6]相关的症状。局部或弥漫性关节疼痛、跛行、单关节炎或多关节炎、肌肉或跛行是最常见的肌肉骨骼症状。有时候这些症状是唯一的症状, 缺失外周血改变^[6,7], 因此儿童 ALL 极易被误诊。国外文献也曾报道, 以关节疼痛为首发症状的 ALL 诊断较为困难^[8], 关节受累的儿童中有 24%没有任何血细胞减少的迹象, 44%没有任何器官肿大或淋巴结肿大^[5]。一项

文献对 7 名不同的风湿病患者进行了随访, 其中 3 例患者在接受类固醇治疗期间被诊断为白血病^[9]。另一项研究中, 在 250 名初步诊断为风湿病的患者中(其中 60%患有有关节炎), 有 5 名(2%) 在随访时被诊断为恶性肿瘤。这些患者的诊断时间在 7 天到 3 个月之间^[10]。有报道, 在 762 名 ALL 患儿中, 6.4%的 ALL 患者最初表现为 JIA^[11]。李怀玉等^[12]报道, 46 例 ALL 患儿中有 23.9% (11/46) 被误诊为 JIA。本例患者最初发病无乏力、贫血、出血等白血病表现, 多关节对称性肿痛且以小关节为主伴有晨僵, 极似幼年特发性关节炎, 实验室检查示血红蛋白、白细胞均正常, 炎症指标升高, 按幼年特发性关节炎治疗后关节症状缓解, 直至患者关节炎反复发作且激素敏感性差, 最终才确诊为急性淋巴细胞白血病, 本患者缺乏 ALL 临床表现, 多次全血细胞计数始终未见异常可能是导致误诊的原因。

对于 ALL 和 JIA 两者鉴别, 在临床表现上, 有文献报道, ALL 患者的关节痛累及的关节数目少, 且主要为踝、膝、肘、肩等大关节, 夜间痛明显, 严重的夜间疼痛, 与临床疾病不成比例的疼痛, 疼痛的频率和严重程度的增加, 或对镇痛药无反应的疼痛, 高度提示恶性, 非关节肌肉骨骼疼痛或骨压痛更应怀疑 ALL, 并可出现突发于骶端的剧烈疼痛, 而 JIA 患者常有多个关节受累, 伴有晨僵、肿胀和轻度疼痛^[5, 13-15, 20-21]。Zombori L 等认为 ALL 患者少有晨僵, ALL 患儿可出现病变部位的透亮带、硬化、溶骨性改变及增厚等, 也有研究发现, 以骨关节痛为表现的 ALL 患儿较 JIA 患儿更易出现肝、脾、淋巴结肿大。

当评估外周血时, JIA 患者以中性粒细胞为主, 而白血病患者以淋巴细胞为主^[13]。Jones 等认为 ALL 患者 LDH 和尿酸升高更常见^[16], McKay D 认为 LDH 升高 2 倍以上^[18]、Zombori L 等认为 LDH 升高 3-4 倍^[17]对 ALL 具有更高的诊断敏感性。在 Ninna Brix 的研究中大多数(63%) 关节受累的儿童中 LDH 升高, 非关节疼痛、外周血母细胞和 LDH 升高是 ALL 的预测因素, 在 94%的关节受累的儿童中至少有一种阳性。Alfonso Ragnar Torres Jimenez 对 76 名白血病关节炎和 JIA 患者进行比较, 结论是对 ALL 的最强预测因子分别是白细胞减少 ($< 4 \times 10^9/L$)、低血小板计数 ($150 \sim 250 \times 10^9/L$) 和夜间疼痛史, 这些值的组合诊断 ALL 的敏感性为 100%, 特异性为 85%。^[19]

另一种可能对 JIA 和 ALL 的鉴别诊断有用的检查方式是影像学检查, 有研究^[22]对比关节受累 ALL 和 JIA 患者的关节 X 线, JIA 患者的关节周围软组织肿胀和局部

骨质疏松较 ALL 更为常见, ALL 患者中骨膜反应和粗糙的骨小梁较 JIA 更为常见, 其中 7.1% ALL 患者出现特征性干垢端透亮带, 而 JIA 患者中未发现。MRI 表现上在 T1WI 上会呈弥漫性低信号, 而在脂肪抑制序列 STIR 上呈弥漫性高信号^[23]。

3 结语

综上, 很高比例的儿童 ALL 存在关节受累, 与无关节受累的儿童相比临床体征不那么明显^[5]。首发症状是关节病的白血病, 极易误诊。故临床医师需提高认识, 有任何不典型的风湿病样表现、系统症状明显如发热、体重下降等、常规抗风湿治疗效果不佳等情况时, 需高度警惕潜在的恶性肿瘤, 及早加强肿瘤相关筛查及随访, 避免误诊、漏诊。

参考文献:

- [1]陈雪,王芳,房建成等. 595 例初诊儿童急性髓系白血病患者 36 种融合基因筛查分析[J].临床与病理杂志,2018,38(6):1202-1206.
- [2]Ferhat Demir.A case of acute lymphoblastic leukemia mimicking juvenile idiopathic arthritis.North Clin Istanb 2019;6(2):184-188.
- [3]李慧霞,刘伟,李度格.儿童急性白血病的误诊分析[J].临床医学,2011,31(1):122-123.
- [4].Cabral DA, Tucker LB. Malignancies in children who initially present with rheumatic complaints. J Pediatr 1999;134:53-7.
- [5]Ninna Brix.Arthritis as presenting manifestation of acute lymphoblastic leukaemia in children.Arch Dis Child 2015;100:821-825.
- [6]Mulder H, Herregods N, Mondelaers V, Benoit Y, De Moerloose B. Musculoskeletal manifestations in children with acute lymphoblastic leukaemia. Belg J Hematol. 2012;3:3-11.
- [7]Ehrenfeld M, Gur H, Shoenfeld Y. Rheumatologic features of hematologic disorders. Curr Opin Rheumatol. 1999;11(1):62-7.
- [8]Zombori L, Kovacs G, Csoka M, et al. Rheumatic symptoms in childhood leukaemia and lymphoma—a ten-year retrospective study[J]. pediatric Rheumatol Online J, 2013, 11: 20.
- [9]Barbosa CM, Nakamura C, Terreri MT, Lee ML, Petrilli AS, Hilário MO. Musculoskeletal manifestations as the onset of acute leukemias in childhood. [Article in Portuguese]. J Pediatr (Rio J) 2002;78:481-4.
- [10]Fonseca MB, Gomes FHR, Valera ET, Pileggi GS, Gonfiantini PB, Gonfiantini MB, et al. Signs and symptoms of rheumatic diseases as first manifestation of pediatric cancer: diagnosis and prognosis implications. Rev Bras Reumatol Engl Ed 2017;57:330-7.
- [11]Marwaha RK, Kulkarni KP, Bansal D, et al. Acute lymphoblastic leukemia masquerading as juvenile rheumatoid arthritis: diagnostic pitfall and association with survival. Ann Hematol 2010;89:249-54.
- [12]李怀玉,郑清,梁丽俊.儿童白血病误诊 46 例分析[J].宁夏医学杂志,2007,29(2):143-144.
- [13]Ostrov BE, Goldsmith DP, Athreya BH. Differentiation of systemic juvenile rheumatoid arthritis from acute leukemia near the onset of disease. J Pediatr 1993;122:595-8.
- [14] Mulder H, Herregods N, Mondelaers V, Benoit Y, De Moerloose B. Musculoskeletal manifestations in children with acute lymphoblastic leukaemia. Belg J Hematol. 2012;3:3-11.
- [15] Ehrenfeld M, Gur H, Shoenfeld Y. Rheumatologic features of hematologic disorders. Curr Opin Rheumatol. 1999;11(1):62-7.
- [16]Jones OY, Spencer CH, Bowyer SL, Dent PB, Gottlieb BS, Rabinovich CE. A multicenter case-control study on predictive factors distinguishing childhood leukemia from juvenile rheumatoid arthritis.Pediatric2006;117:e840-4.
- [17]Zombori L, Kovacs G, Csoka M, Derfalvi B.Rheumatic symptoms in childhood leukaemia and lymphoma—a ten-year retrospective study. Pediatr Rheumatol Online J 2013;11:20.
- [18]McKay D, Adams L, Ostring G, Singh-Grewal D. In a child presenting with features consistent with a diagnosis of juvenile idiopathic arthritis, what clinical features or laboratory findings (at presentation) predict a diagnosis of acute lymphoblastic leukaemia J Paediatr Child Health 2010;46:442-5.
- [19]Alfonso Ragnar Torres Jimenez.Diferences between leukemic arthritis and juvenile idiopathic arthritis.Torres Jimenez et al. Pediatric Rheumatology, 2023(21):50.

[20]Raj B K A, Singh KA, Shah H. Orthopedic manifestation as the presenting symptom of acute lymphoblastic leukemia[J]. J Orthop, 2020, 22: 326-330.

[21] Brix N, Hasle H, Rosthøj S, Herlin T. Characteristics of children with acute lymphoblastic leukemia presenting with arthropathy. Clin Rheumatol. 2018;37(9):2455-2463.

[22]Tafaghodi F, Aghighi Y, Rokni Yazdi H, et al. Predictive plain X-ray findings in distinguishing early stage acute lymphoblastic leukemia from juvenile idiopathic arthritis[J]. Clin Rheumatol, 2009, 28(11):1253-1258.

[23]王静石,于泓,孟醒,等.儿童急性白血病骨髓浸润的MRI与MRS分析[J].广东微量元素科学,2017,24(01):42-45.

作者简介: 孙玄静(1984—),女,汉族,江苏徐州,硕士研究生,南京中医药大学徐州附属医院,副主任中医师,研究方向:中西医结合治疗风湿性疾病、肾脏疾病。通讯作者:张秀胜(1985—),男,汉族,山东沂水,医学博士,南京中医药大学徐州附属医院,副主任中医师,研究方向:中西医结合治疗内科疾病。