

优质护理管理理念在小儿支气管肺炎护理管理中的应用效果

谢 艳

昆山市第二人民医院 江苏苏州 215300

摘要:目的 研究和探析优质护理管理理念在小儿支气管肺炎护理管理中的应用效果。方法 本次研究将我院在2020年7月至2021年10月之间所收治的50例小儿支气管肺炎治疗的患者纳入研究,依据数字随机法的分组方法将患儿分为对照组($n=25$)和观察组($n=25$)。对照组实施的护理方式是常规护理,观察组实施优质护理管理理念进行护理,对比两组当中患儿的各项症状消失时间、护理效果和护理满意度。结果 观察组当中患儿的咳嗽、呼吸困难、肺部哮鸣音以及喘息在内的疾病症状消失时间均比对照组当中患儿更短,数据在采取对比之后存在统计学意义($P < 0.05$)。观察组当中患儿的护理效果比对照组当中患儿更高,数据在采取对比之后存在统计学意义($P < 0.05$)。观察组当中患儿实施干预之后的护理满意度比对照组当中患儿更高,数据在采取对比之后存在统计学意义($P < 0.05$)。结论 在护理小儿支气管肺炎患儿期间,对其实施优质护理管理理念的护理方式可以对患儿的疾病情况进行改善,患儿的护理效果以及满意度均比较高。

关键词: 优质护理; 小儿支气管肺炎; 护理效果; 护理满意度

小儿支气管肺炎作为临床当中比较常见的一种儿科呼吸系统疾病,该疾病的起病比较急、发病速度快,在某种程度上会对患儿的生长发育、生命健康以及生活质量造成较大的影响。在对小儿支气管肺炎患儿实施临床救治期间,因为患儿的身体免疫力比较低、抵抗能力较差,且身体当中的各项机体功能没有完全发育,在患儿治疗期间,必须对其实施优质以及有效的护理措施,进而对患者的临床治疗效果进行保证,推动患儿身体的恢复^[1]。以优质护理理念为指导为患儿实施护理措施能够从各个方面对患儿的生活质量进行提升,在护理期间采取各项措施提升患儿对于治疗工作的积极性,进而对治疗的效果进行提升^[2]。本文正是基于此,选择了2020年7月至2021年10月之间我院收治的50例小儿支气管肺炎患儿为对象,研究和探析优质护理管理理念在小儿支气管肺炎护理管理中的应用效果。详情如下。

1. 资料与方法

1.1 一般资料

本研究选择2020年7月至2021年10月间在我院收治的50例小儿支气管肺炎治疗的患者纳入研究。纳入标准:患者均在实施检查之后确定为小儿支气管肺炎患者;患儿家属在实施护理措施前就对本次研究内容知晓且自愿加入本次研究;研究内的患儿均能够对相关资料进行提供。排除标准:有着其他的严重肺部病变的患儿;免疫功能出现障碍的

患儿;认知以及精神存在障碍的患儿;患有器质性病变的患儿;对本研究不配合的患儿;存在有严重的先天性疾病的患儿。依据数字随机法的分组方法将患儿分为对照组($n=25$)和观察组($n=25$)。对照组:男孩和女孩的比例为14:11,最大年龄值和最小年龄值分别是12岁和4岁,年龄均值为 (8.94 ± 1.25) 岁。观察组:男孩和女孩的比例为15:10,最大年龄值和最小年龄值分别是13岁和4岁,年龄均值为 (8.98 ± 1.37) 岁。对照组以及观察组内的患儿的资料在进行对比之后无显著的差异($P > 0.05$)。

1.2 方法

对照组实施的护理方式是常规护理,医护人员需要依据医嘱对患儿实施用药干预,告知患儿家属需要对患儿的用药治疗情况进行监督,医护人员需要对患儿家属进行正确治疗方法的指导。观察组实施优质护理管理理念进行护理,方法为:1、护理方案规划的制定:院内的护理部需要进行护理工作任务的制定,医护人员需要依据相关的制度实施护理,避免护理工作期间出现护理事故进而对患儿的治疗工作造成影响。医护人员在患儿入院之后需要对其疾病的情况进行积极的观察,为患儿进行护理治疗方案的制定,且在实施护理期间需要对护理当中所存在的错误进行及时的纠正,对医护人员的护理水平进行提高。2、优化护理措施:医护人员需要强化支气管肺炎患儿的生命体征检测力度,对患儿以及

患儿家属实施必要的健康宣教, 在实施健康宣教期间需要对患儿家属的受教育水平进行观察, 实施简单和易懂的方式实施健康教育。健康宣教的主要内容有疾病知识、治疗成功案例、治疗措施对于疾病稳定性的重要性、告知患儿家属支气管肺炎疾病的急救护理措施等等。医护人员还需要强化患儿的用药护理措施^[3], 让患儿和患儿家属可以实施正确的用药方式, 对治疗期间的注意事项告知给患儿以及患儿家属。除此之外, 医护人员需要依据患儿的情况对其实施饮食护理, 让患儿能够形成规律化的饮食习惯。3、心理护理: 医护人员需要对患儿的心理情绪^[4]进行观察, 让患儿家属参与至护理工作当中, 多采取肢体接触的方式对患儿的情绪进行安抚, 防止患儿因为哭闹不配合治疗, 进而对治疗的效果造成影响。

1.3 观察指标

对比两组当中患儿的各项症状消失时间、护理效果和护理满意度。1、各项症状消失时间: 主要为咳嗽、呼吸困难、肺部哮鸣音以及喘息在内的疾病症状消失时间。2、护理效果: 显效: 实施护理干预措施之后患者的症状全部消失, 肺功能指标恢复正常。有效: 实施护理干预措施之后患者的症状以及肺功能指标有了明显的改善, 但依旧需要药物加以控制; 无效: 进行护理干预措施之后患者情况与上述情况不符合。总有效概率为显效率加上有效率。3、护理满意度: 实施自制护理满意度调查表对护理满意度进行评估, 分为极为满意、一般满意和不满意, 总满意程度为极为满意度+一般满意度。

1.4 统计学处理

本次研究内的结果数据实施软件 SPSS21.0 进行处理, 计数资料实施 $n(\%)$ 进行表示, 比较采取卡方检验, 计量资料实施 $\bar{x} \pm s$ 进行表示, 比较采取 t 检验, $P < 0.05$ 数据间具备意义。

2. 结果

2.1 比较两组当中患儿的各疾病症状消失时间

观察组当中患儿的咳嗽、呼吸困难、肺部哮鸣音以及喘息在内的疾病症状消失时间均对比组当中患儿更短, 数据在采取对比之后存在统计学意义 ($P < 0.05$), 数据的内容如下表 1 所示。

表 1 两组当中患儿的各疾病症状消失时间对比 ($\bar{x} \pm s$, 天)

组别	例数	咳嗽	呼吸困难	肺部哮鸣音	喘息
对比组	25	4.53 ± 1.07	3.16 ± 0.69	4.81 ± 0.78	4.36 ± 0.72
观察组	25	2.68 ± 0.80	2.31 ± 0.54	3.46 ± 0.52	3.28 ± 0.37
t	-	3.924	3.051	3.278	3.171
P	-	0.000	0.000	0.000	0.000

2.2 两组当中患儿的护理效果对比

观察组当中患儿的护理效果比对比组当中患儿更高, 数据在采取对比之后存在统计学意义 ($P < 0.05$), 数据的内容如下表 2 所示。

表 2 两组当中患儿的护理效果对比 [例 (%)]

组别	例数	显效	有效	无效	总有效概率
对比组	25	11 (44.00)	9 (36.00)	5 (20.00)	20 (80.00)
观察组	25	15 (60.00)	10 (40.00)	0	25 (100.00)
χ^2	-	-	-	-	6.756
P	-	-	-	-	0.012

2.3 两组当中患儿实施干预之后的护理满意度对比

观察组当中患儿实施干预之后的护理满意度比对比组当中患儿更高, 数据在采取对比之后存在统计学意义 ($P < 0.05$), 数据的内容如下表 3 所示。

表 3 两组当中患儿实施干预之后的护理满意度对比 [例 (%)]

组别	例数	极为满意	一般满意	不满意	总满意度
对比组	25	12 (48.00)	8 (32.00)	5 (20.00)	20 (80.00)
观察组	25	18 (72.00)	6 (24.00)	1 (4.00)	24 (96.00)
χ^2	-	-	-	-	5.163
P	-	-	-	-	0.028

3. 讨论

支气管炎属于临床当中一种比较常见的疾病, 患者的临床特征为反复发作的咳嗽, 患者还可能会伴随存在有呼吸困难的情况, 还有部分的患者会伴随存在有气道高反应性呼吸道疾病。近几年来, 因为遗传因素以及环境因素等影响, 导致国内的小儿支气管肺炎患病概率越来越高, 处于急性发作期期间的患儿疾病情况大多比较紧急, 患者的肺部功能受损情况也更为严重, 还有一部分患儿还会失去体力活动能力, 必须对患儿实施及时的治疗措施来对患儿的生命安全进行挽救。临床之中, 为了对患儿治疗过程当中的依从性进行保证, 同时对治疗的效果进行保证, 必须对患儿实施必要性的护理干预措施, 以优质护理管理理念为基础的护理措施是现阶段为了对群众生活治疗提升进行顺应的新型化的护理干预措施之一, 可以对患儿在治疗期间的积极性进行提升^[5]。

以往的研究发现^[6],在临床护理当中实施以优质护理管理理念为基础的护理措施能够对对应的岗位实施设立,对各个岗位内的人员的工作职责进行明确,进一步提升医护人员对于护理工作的重视度,同时还进行了合理以及科学化的护理流程的制定,大大提升了医护人员所实施的护理工作的合理性以及科学性。然而,在对患儿实施护理期间,为了对患儿的生命安全进行保证,必须在患儿入院期间就对其生命体征实施检测,方便患儿在发生异常期间可以及时进行发现并且及时对患儿进行抢救。患儿在取得了有效的治疗期间,医护人员还需要对患儿家属实施健康宣教,需要以患儿以及患儿家属的理解能力为依据为其选择合适的措施加以干预,让患儿的家属可以对健康教育的内容更为理解,提高患儿家属对于患儿疾病治疗的重视程度,提升患儿在疾病治疗期间的配合度^[7]。除此之外,在实施护理措施期间还必须对患儿以及患儿家属实施心理护理,采取对患儿以及患儿家属不良情绪进行稳定的基础之上,提升其在护理开展期间的配合度,医护人员对患儿以及患儿家属进行药物使用的正确方式可以显著提高患儿的用药依从性^[8]。本研究对比两组当中患儿的各项症状消失时间、护理效果和护理满意度之后发现,观察组当中患儿的咳嗽、呼吸困难、肺部哮鸣音以及喘息在内的疾病症状消失时间均比对比组当中患儿更短,数据在采取对比之后存在统计学意义($P < 0.05$)。观察组当中患儿的护理效果比对比组当中患儿更高,数据在采取对比之后存在统计学意义($P < 0.05$)。观察组当中患儿实施干预之后的护理满意度比对比组当中患儿更高,数据在采取对比之后存在统计学意义($P < 0.05$)。可见,运用优质护理管理理念的护理方式对小儿支气管肺炎患儿进行治疗,可以取得比较确定

的临床护理效果。

综上所述,对小儿支气管肺炎患儿实施优质护理管理理念的护理方式可以对患儿的疾病情况进行改善,患儿的护理效果以及满意度均比较高,值得推广。

参考文献

- [1] 吴艳. 小儿支气管肺炎行头孢西丁治疗中给予优质护理服务的研究[J]. 沈阳药科大学学报, 2021,38(S1):23+25.
- [2] 郭全英. 优质护理在小儿支气管肺炎中的应用效果及对患儿肺功能、炎症因子的影响分析[J]. 医学食疗与健康, 2021,19(16):117-118.
- [3] 宋凤玉. 优质护理在小儿支原体肺炎护理中的应用效果[J]. 中外女性健康研究, 2022,(5):113-115.
- [4] 谢远娟. 小儿支原体肺炎护理干预影响[J]. 智慧健康, 2018,4(33):97-98,100.DOI:10.19335/j.cnki.2096-1219.2018.33.048.
- [5] 李璇. 优质护理服务在小儿支气管肺炎患者护理中的影响[J]. 中国医药指南, 2021,19(18):179-180.
- [6] 薛佳艳, 邬国英. 优质护理在小儿支气管肺炎患儿护理中的应用效果[J]. 实用心脑血管病杂志, 2020,28(S2):202-204.
- [7] 颜芬, 王晓宾. 优质护理对小儿支气管肺炎患儿肺功能与治疗效果的影响研究[J]. 中国医药指南, 2020,18(19):13-14+17.
- [8] 周静, 柯苗苗. 优质护理用于小儿支气管肺炎患儿护理中对其肺功能和治疗效果影响[J]. 贵州医药, 2020,44(01):165-166.