

SLEEP- MAD 在 ICU 睡眠障碍患者中的应用效果分析

吴美玲

皖南弋矶山医院重症医学科 安徽芜湖 241000

摘要:目的:探讨 SLEEP- MAD 在 ICU 睡眠障碍患者中的应用效果。方法:以 120 例睡眠障碍患者为研究对象,每组 60 例;对照组采用人文关怀,观察组基于 SLEEP- MAD 护理策略,采用中文版理查兹-坎贝尔睡眠质量(RCSQ)进行睡眠质量评估。结果:观察组显著高于对照组($P < 0.05$);两组满意度分别为 96.7%与 83.3%。结论:SLEEP- MAD 模式有利于改善患者的睡眠质量,提高护理满意度。

关键词:睡眠障碍;SLEEP- MAD 模式;理查兹-坎贝尔睡眠质量(RCSQ)

临床护理过程中发现,ICU 患者往往难以安静入睡,半睡半醒、失眠、睡眠时间不足、时睡时醒等状况比较常见^[1]。如对陌生环境的不适应、疼痛、光线刺激、仪器报警、医护人员谈话声、治疗与护理操作。采用 SLEEP- MAD 模式标准化的流程,改善患者睡眠质量,现将效果总结如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象 ICU 睡眠障碍患者为研究对象。纳入标准:(1)神志清楚;(2)配合程度高。排除标准(1)意识障碍患者;(2)有精神病史。对照组年龄 63.0±14.0 岁;男性 35 例,女性 25 例。观察组年龄 60.9±13.9 岁;男性 36 例,女性 24 例。两组无统计学意义($P > 0.05$)。

1.2 研究方法

对照组给予人文关怀。观察组采取 SLEEP- MAD 护理策略。

1) 镇静的管理:成立镇静镇痛安全管理小组,麻醉药品专柜加锁、专用处方、专册登记、保留空安瓿。严格遵医嘱用药,掌握药品的剂量、用法及不良反应。采用 Richmond 躁动镇静量表(RASS)评分。浅镇静时,镇静深度的目标值为 RASS -2~+1 分;较深镇静时,镇静深度的目标值为 RASS -3~-4 分;当合并应用-肌肉阻滞剂时,镇静深度的目标值应为 RASS -5 分^[2]。Ramsay 评分小于目标 2 分为镇静不足,大于目标 2 分为镇静过深^[3];每日中断唤醒。2) 光刺激管理:调节灯光;降低仪器设备的亮度;佩戴眼罩;使用窗帘遮挡。3) 防噪:使用耳塞减少噪声的分贝;张贴保护安静的标识,及时处理各种仪器报警信息;采用静音纸巾架,治疗车静音轮。4) 环境干扰:诊疗操作集中进行;设置钟表于患者正前方向,进行感知性训练;配备写字板,制作沟通转盘和图册为不能自主表达的患者提供需求,清醒患者配备呼叫器。5) 镇痛管理:早期舒适化、镇痛为先、最小化镇静策略,实现最大化人文关怀;采用重症监护疼痛观察工具(CPOT),每 4 h 评估 1 次^[4]。6) 药物治疗:实现镇静监测与药物调节同步,保持目标镇静最优状态^[5],无监测,勿镇静。7) 早期活动:康复师制定当日计划,意识昏迷,深度镇静,四肢关节被动活动。配合完成指令者,每日床上坐位。肢肌力三级以上者,可协助转移至座椅,做深呼吸和呼气锻炼,训练患者呼吸。8) 谵妄防治:采用 ABCDEF 集束化谵妄预防方法。A(疼痛的评估与管理)侵入性操作前先镇痛。B(觉醒试验和自主呼吸试验)实行镇静剂的中断或镇静剂的暂停,在保证觉醒试验安全下执行自主呼吸试验,预测能否撤机。C(镇静镇痛的选择)镇静状态达到“3C 原则”,即患者安静、舒适、合作^[6]。D(谵妄评估预防及管理)每日进行 CAM-ICU 谵妄评估。E(早期活动)以患者耐受性为基础循环渐进。F(家庭成人参与)特殊患者可以预约探视。

1.3 研究工具

RCSQ 分 5 个维度,睡眠的深度,睡眠的时间,夜间觉醒的次数,醒后再入睡,睡眠的总体情况。该量表由患者在 5 条 100 的线上进行视觉模拟自我评估,0~25 分睡眠质量差,

76~100 分睡眠质量好,26~75 分睡眠质量一般^[4]。

1.4 统计方法

SPSS 26.0 软件进行数据分析。定量资料采用($\bar{x} \pm s$)进行描述,组间采用 t 检验;分类资料采用卡方检验。 $P < 0.05$ 有统计学意义。

2 结果

2.1 RCSQ 见表 1

表 1 理查兹-坎贝尔睡眠质量(RCSQ)维度得分比较($\bar{x} \pm s$)

组别	N	睡眠深度	入睡时间	觉醒	再入睡难度	整体睡眠质量
对照组	60	73.8±6.2	71.4±4.9	71.9±7.9	68.1±6.0	77.2±3.2
观察组	60	78.6±4.6	78.0±4.6	79.5±3.9	75.1±4.3	82.1±3.1
t		4.814	7.469	6.436	8.270	8.484
P		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

2.2 患者满意度 见表 2

表 2 两组病人满意度[例(%)]

组别	N	满意度		比例(%)
		满意	不满意	
对照组	60	50	10	83.3
观察组	60	58	2	96.7
χ^2			4.537	
P			0.033	

3 讨论

根据 Sleep- MAD 模式护理策略,制定改善睡眠的集束化护理措施。包括镇静镇痛管理,每日唤醒;负责病房内环境管理;成立人文关怀小组,制作健康睡眠知识海报;对清醒患者进行 CAM-ICU 谵妄评估,每日汇报谵妄患者;制定功能锻炼措施,防止肌力萎缩,促进患者早期康复。

结果显示,基于 SLEEP- MAD 模式护理干预可显著改善 ICU 睡眠障碍患者的睡眠质量,提升患者满意度,可扩大样本量进一步探讨,以为其推广应用提供基础。

参考文献

- [1] 刘东侠. 重症监护室患者的睡眠障碍与有效护理方式分析[J]. 世界睡眠医学杂志, 2018, 5(12): 1513-1515.
- [2] 蒋国平, 田昕. 中国成人 ICU 镇痛和镇静治疗 2018 指南解读[J]. 浙江医学, 2018, 40(16): 1769-1788.
- [3] 高春华, 尹慧芳, 孙丹萍. ICU 护士主导的目标性镇静镇痛安全管理方案[J]. 中国实用护理杂志, 2014, 30(1): 65-66.
- [4] 武文静, 张晓红, 薛武鹏, 等. SLEEP- MAD 模式改善 ICU 患者睡眠障碍的应用效果分析[J]. 中华现代护理杂志, 2020, 2(11): 1445-1449.
- [5] 葛向煜, 胡雁, 徐建鸣, 等. 护士主导程序化镇静对镇静效果及机械通气结局影响系统评价[J]. 中国循证医学杂志, 2015, 15(4): 445-451.
- [6] 赵先美, 叶曼, 李知音, 等. eCASH 理念运用于 ICU 机械通气患者镇静镇痛管理的效果评价[J]. 中国护理管理, 2018, 18(4): 533-537.