

心脏手术中手术室护理与麻醉工作配合的满意度分析

萨吉旦木·卡地尔 王燕茹

新疆喀什地区第二人民医院 新疆喀什 844000

摘要:目的:探究心脏手术中手术室护理与麻醉工作配合的满意度,并且对其进行相应的分析。方法:选取我院 2019.6-2020.8 收治的心脏手术患者 44 例进行研究,所有患者均给予术前、术中以及术后的麻醉配合护理,对于患者的手术情况进行观察,首先对于所有患者术前和术后的生活质量情况进行评估并比较;然后,评价两组患者术后的护理满意度并进行对比。结果:经过观察,所有患者在术中并没有发现有窒息、疼痛等一些不良的症状,术前的心理评分是(1.43±0.45)、睡眠评分是(1.85±0.43)、饮食评分是(1.57±0.11),精神评分是(1.83±0.17),术后的心理评分在(3.57±0.76)、睡眠评分在(4.48±0.24)、饮食评分在(4.35±0.47)、精神评分是(4.93±0.35),经过比较,患者生活质量情况相比于术前较好, $P<0.05$;并且,患者的护理满意度较高。患者在术后的护理满意度情况是:术后经过调查,只有 1 例是不满意,43 例满意,满意度在 97.73%。结论:心脏手术中手术室护理与麻醉工作配合的效果较好,患者的生活质量有效的得到了改善,使得患者手术后的预后较好,促进了患者的术后恢复。并且,有效的提高了护理满意度;综上所述,心脏手术中手术室护理与麻醉工作配合非常有助于心脏手术的顺利进行,促进了手术治疗的有效性,保障了患者的生命安全。

关键词:心脏手术;手术室护理;麻醉工作;满意度

前言

手术治疗属于目前在临床中比较常见的治疗方法,促进了很多疾病的治疗^[1]。但是,手术治疗后的预后以及效果是由整个手术相关的因素所构成和决定的,包含有麻醉措施、工作者手术操作技能以及护理者工作配合等^[2]。为了很好地使得手术可以顺利的完成,就要做好手术室护理以及麻醉工作,这样可以完善的促使手术良好的完成^[3]。我院对于心脏手术中手术室护理和麻醉工作进行了研究,取得了较好的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院 2019.6-2020.8 收治的心脏手术患者 44 例进行研究,所有患者均给予术前、术中以及术后的麻醉配合护理,对于患者的手术情况进行观察,评估所有患者术后的生活质量情况以及护理满意度。所研究的患者,男 24 例,女 20 例;年龄在 24-54 岁,平均(39.0±11.50)岁。

1.2 方法

在患者术前引导患者积极配合,手术室护理的具体方法如下:护理人员一定要清楚了解患者的情况,将患者的所有详细资料以及既往的病史进行记录,例如年龄、身体以及并发症等。并且,将心脏手术要进行动脉穿刺的情况、给予患者心脏位置放一截导管等告知患者及家属。护理人员应该保持亲切的态度对待患者,与患者进行有效的沟通,对于患者提出的问题应该详细的进行解答,缓解患者的焦虑和不良的情绪等;为患者介绍一些手术成功的案例,帮助患者构建信心;纠正患者对于心脏手术麻醉的不正确认识,减少患者对于麻醉的顾虑。护理人员要做好患者的每一项检查,不可以忽略;在患者术前应该根据患者的基本情况做好患者的相关手术准备工作。评估患者的麻醉风险意识,对于一些麻醉风险较大的患者应该多给予关注,从而保障手术的顺利进行。术中麻醉护理,对于麻醉插管护理工作,可以将其分为吸除分泌物、四肢固定以及气管插管等;构建静脉通道,护理人员提醒麻醉师注射药物,要注意不可以注射与麻醉药物相悖的药物。护理人员应该积极配合麻醉师进行麻醉工作,密切关注患者心率、血压等。

1.3 观察指标

对于所有患者术后的生活质量情况进行评估,并且评价患者护理满意度。

1.4 统计学方法

所有研究数据均采用统计学软件 SPSS 23.0 对本次实验数据予以处理,用[n(%)]表示计数资料,经 χ^2 检验;用($\bar{x}\pm s$)表示计量资料,经 t 检验。通过 $P<0.05$ 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 患者生活质量情况评分对比

所有患者在术后的生活质量情况评分高于术前, $P<0.05$ 。见表 1。

表 1 患者生活质量情况评分对比

组别	例数	心理	睡眠	饮食	精神
术前	44	1.43±0.45	1.85±0.43	1.57±0.11	1.83±0.17
术后	44	3.57±0.76	4.48±0.24	4.35±0.47	4.93±0.35
T	--	8.6666	5.0078	10.2599	8.3155
P	--	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2.2 患者在术后的护理满意度情况是:术后经过调查,只有 1 例是不满意,43 例满意,满意度在 97.73%。

3 讨论

在心脏手术中运用麻醉的效果会直接影响到患者手术的治疗效果,对于患者手术的安全性有着很大的影响^[4]。传统的手术不能够完全满足现阶段手术治疗的需求^[5],所以,在实施手术的过程中要运用比较有效的护理措施进行^[6]。心脏手术比较的复杂,对于手术护理和麻醉的要求很高,在手术的过程中会出现一些异常的情况,这就需要麻醉师和护士进行有效的配合和团结,这样才可以更好地促进手术的顺利完成。我院在心脏手术中应用了手术室护理和麻醉工作配合,效果较好。

本次研究表明:心脏手术中手术室护理与麻醉工作配合的效果较好,患者在术后的生活质量有了很大的改善,患者满意度较高。通过在术中规范的进行手术室护理以及做好麻醉工作的配合,促进了患者的手术可以顺利进行。

综上,心脏手术中手术室护理与麻醉工作配合的效果较好,改善了患者生活质量,提高了患者满意度,值得推广应用。

参考文献

- [1]王敏.全方位保温措施在手术室护理中的应用[J].中国现代医学,2020,32(07):166-168.
- [2]孔丹.零缺陷理论应用于心脏手术患者手术室护理中的效果分析[J].基层医学论坛,2020,24(06):784-785.
- [3]王丽,宋冬卓,吕佳瑞.心脏手术中手术室护理与麻醉工作的配合效果[J].深圳中西医结合杂志,2019,29(23):196-197.
- [4]陈慕秋.零缺陷护理模式在心脏手术手术室护理实践中的应用[J].中国现代药物应用,2019,13(16):170-171.
- [5]杨碧霞,何蕾.心脏手术中手术室护理与麻醉工作的配合体会[J].中国现代药物应用,2019,13(07):175-176.
- [6]郑婷婷.优质护理在心脏手术患者手术室护理中的实践分析[J].健康之路,2018,17(11):227-228.