

解读介入护理对脑血管介入治疗效果与护理满意度的影响

王丽娜 李春霞 马 寒 张晓娟

郑州大学第一附属医院介入科 河南 郑州 450052

DOI:

【摘要】 目的:对脑血管介入治疗患者进行护理的过程中,应用介入护理的临床效果进行深入的研究。**方法:**选择我院于2017年4月至2018年10月期间内收治的脑血管患者来开展研究,患者共计102例。在对患者进行分组的过程中,应用随机分组的方式,将患者平均分为对照组和观察组,每组各51例患者。在对患者进行护理时,给予对照组患者常规护理服务,观察组则在对照组的基础上,开展介入护理,以此来对两组患者的治疗效果以及护理满意度进行对比。**结果:**在经过一段时间的护理后,在治疗效果方面,观察组患者明显较对照组患者更优($P < 0.05$),具有统计学意义;除此之外,观察组患者的护理满意度同样明显较对照组患者更优($P < 0.05$),具有统计学意义。**结论:**在对脑血管介入治疗患者进行护理的过程中,应用介入护理可以很好的帮助患者提升康复速度,保证患者的治疗有效率,于此同时,介入护理还可以很好的改善护患关系,提升患者的护理满意度,具有临床推广价值。

【关键词】 介入护理;脑血管介入治疗;治疗效果;护理满意度

随着生活节奏的加快和生活习惯的改变,脑血管疾病的发病率在我国呈现出逐年增长的趋势。随着医学技术的不断发展,介入式治疗逐渐成为了治疗脑血管疾病的主要方式之一,但是在患者卧床治疗以及恢复的过程中,很容易出现各种并发症,因此针对性的对患者和进行护理是非常必要的^[1]。笔者对脑血管介入治疗患者进行护理的过程中,应用介入护理的临床效果进行了深入的研究,具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院于2017年4月至2018年10月期间内收治的脑血管患者来开展研究,患者共计102例。在对患者进行分组的过程中,应用随机分组的方式,将患者平均分为对照组和观察组,每组各51例患者。在观察组中,共有男性患者26例和女性患者25例,患者年龄区间为51~89岁,平均年龄为(60.4±2.1)岁;在对照组中,共有男性患者27例和女性患者24例,患者的年龄区间为50~88岁,平均年龄为(59.8±1.8)岁,所有患者及其家属均对本研究知情且自愿签署研究知情同意书,在此基础上对照组与观察组患者一般资料不具有明显的差异($P > 0.05$),因此本研究对比具有统计学意义

1.2 方法

在对所有患者进行治疗的过程中,均采用介入

治疗的方式,并在术后针对性的给予患者低分子肝素抗凝治疗。在对对照组患者进行护理的过程中,给予患者常规护理服务,在对观察组患者进行护理的过程中,在对照组的基础上,开展介入护理,具体护理措施可以归纳为以下几个方面:①心理护理 为了避免患者的不良情绪和负面心理对其治疗效果产生影响,护理人员需要针对性的开展心理护理,通过与患者进行沟通和交流,通过亲切热情的态度来提升患者的治疗配合度,并为患者讲解治疗的方法和注意事项,通过这样的方式来更好的避免患者出现担忧、焦虑等情绪。②饮食护理 在患者治疗的过程中,护理人员应该高度重视患者的饮食情况,结合患者的实际情况来制定饮食方案,并对患者的饮食习惯进行培养。以此来快速的排除患者体内的造影剂。③术中护理 在患者进行手术治疗的过程中,护理人员应该全程进行陪同,帮助患者选择较为舒适的体位,同时对患者的生命体征进行全面的监控,一旦发现患者出现异常,及时反映给医生并配合医生开展救治。④并发症护理 为了更好的避免患者治疗过程中出现并发症,护理人员需要针对性的开展并发症护理,在手术过程中对患者的情况进行全面的观测,在术后提升对患者生命体征的检测,同时对患者皮肤情况进行观察,一旦发现哪一方面出现异常,则应及时采用针对性的应对措施,以此来更

好的避免并发症对患者的恢复造成影响。

1.3 观察指标

①对对照组患者与观察组患者的治疗效果进行统计并对比;②对对照组患者与观察组患者的护理满意度进行调查并对比。

2 结果

2.1 两组患者的治疗效果对比

表 1 两组患者的治疗效果对比

组别	n	显效	有效	无效	总有效率
观察组	51	24	25	2	49(96.08)
对照组	51	13	27	11	40(78.43)
P	—	—	—	—	<0.05

2.2 两组患者的护理满意度对比

表 2 两组患者的护理满意度对比

组别	n	非常满意	满意	不满意	总满意度
观察组	51	28	22	1	50(98.04)
对照组	51	17	24	10	41(80.40)
P	—	—	—	—	<0.05

3 讨论

作为一种致残率较高的疾病,很多患者在患脑血管疾病的过程中,都会出现偏瘫、残疾等症状,不但会对患者的身体带来很大危害,同时也会给患者的心理造成很大的压力。在目前的临床治疗过程中,对脑血管病患者进行治疗的过程中,介入治疗是一种非常常用的治疗方式,通过应用介入治疗的同时,配合开展介入护理,可以很好的帮助患者在较短的时间内恢复肢体功能,与此同时,介入护理还可以很好的提升患者的治疗配合度,从而更好的保证护

1.4 统计学方法

用统计学软件 SPSS 21.0 进行统计分析。计量资料用($\bar{x} \pm s$)表示,组间比较采用 t 检验,计数资料以例数或率表示,组间比较采用 χ^2 检验。 $P < 0.05$ 表示差异具有统计学意义。

理的质量^[2]。在本次研究的过程中,在经过一段时间的护理后,在治疗效果方面,观察组患者明显较对照组患者更优($P < 0.05$),具有统计学意义;除此之外,观察组患者的护理满意度同样明显较对照组患者更优($P < 0.05$),具有统计学意义。

综上所述,在对脑血管介入治疗患者进行护理的过程中,应用介入护理可以很好的帮助患者提升康复速度,保证患者的和治疗有效率,与此同时,介入护理还可以很好的改善护患关系,提升患者的护理满意度,具有临床推广价值。

【参考文献】

- [1]李洁. 介入护理在脑血管介入治疗患者中的应用效果分析[J]. 山东农业工程学院学报,2017,34(06):126—127.
- [2]萧莉. 脑血管介入患者术前焦虑的心理护理干预效果研究[J]. 中国实用医药,2018,13(25):154—156.
- [3]李月,韦朗,黄椿. 结构式心理护理对脑血管介入治疗患者负面情绪及并发症的影响[J]. 世界最新医学信息文摘,2019,19(42):282+285.
- [4]张桂荣. 急性脑梗死超早期血管内介入治疗与脑血管造影效果的观察及护理体会[J]. 世界最新医学信息文摘,2019,19(29):274+276.