

无缝隙护理在手术室护理中的应用及其安全性分析

孙宇

淮安市妇幼保健院 江苏淮安 223001

摘要：目的：分析手术室护理期间予以无缝隙护理对其安全性的效果探究。方法：选取2020年1月-2021年12月截止，期间纳入患者74例，作为临床分析对象，将研究纳入患者依照其护理方式进行分组，小组人数上限设置为37例，对照组行基础护理，研究组予以无缝隙护理，比较护理满意度、不良反应情况等。结果：两组患者满意度情况对比，满意度情况分别为(81.08%)、(97.29%)，对照组护理满意度较差；两组不良反应情况对比，不良反应分别为(8.10%)、(27.02%)，对照组不良反应较多，(P<0.05)。结论：手术室护理期间予以无缝隙护理干预，效果极为明显，能够显著提高其护理满意度情况，降低不良反应发生情况，全面保障病患生命安全，值得临床推荐使用。

关键词：安全性；无缝隙护理；手术室护理

随着社会的发展，人们的生活质量逐渐提高，对于护理服务的要求也随之提升。加之近年来医疗技术逐渐成熟，选择手术治疗的患者越来越多，人们愈发重视护理干预，因此手术室护理干预极为关键。手术室作为医疗领域中极为特殊的场所，患者临床接受治疗期间，对于手术室护理服务要求较高，而无缝隙护理为现代医疗体系中具有连续性、完整性、无缺性护理服务，能够全面满足患者心理、生理需求，提高临床治疗效果。本文选取我院诊治患者74例进行研究，具体内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院诊治74例病患参与研究，将其依照护理方式进行分组，每组37例，入选患者及家属双方均知晓研究全过程，且积极申请参与，并同意授权。对照组男20例，女17例，年龄28~76岁，均数年龄(53.8±3.3)岁；研究组男18例，女19例，年龄30~78岁，均数年龄(54.1±2.9)岁，患者一般资料无统计学意义，P>0.05。

1.2 方法

对照组予以基础护理，护理人员依照科室内容及院内相关规定予以患者护理服务，解决患者基本需求。

研究组予以患者无缝隙护理干预，首先护理人员需要全面了解患者症状信息，结合病患机体症状予以相应的护理服务，指导患者术前禁食、禁饮，依照其手术类型指导患者进行术前体位练习，引领患者与术前充分了解手术室情况及相关环境，并清晰知晓自身症状情况、治疗方式、护理流程等，能够有效提高患者治疗依从性、护理配合度等。治疗期间全程陪护，安慰患者紧张情绪，做好护理服务，防止并发症发生，为患者做好保暖工作，降低低体温症、寒颤等情况发生，维持手术内无菌环境，将室温调整到23摄氏度、湿度50%，治疗期间密切关注患者生命体征，如有突发情况及时联系主治医师，术后加强对患者关注，待其生命体征平稳后，将其送入病房，并提高其夜间巡查频率，同时定期检测患者引流管情况，避免出现阻塞，术后初期饮食以流食为主，随症状康复科转至半流食、全食等，患者康复初期饮食以软糯易消化物品为主，对于蔬菜、水果等维生素含量较高的食物需要提高食用量，严禁使用刺激类、辛辣食物。

1.3 评价指标

本次临床研究相关数值，均由我科室护理人员进行记录，护理满意度：详细记录临床护理满意度情况，满意度=(较为满意+非常满意)/小组病患×100%。不良反应：由护理人员统计出患者康复期间多种不良反应发生情况、时间、症状、次数等，统计后进行对比。

1.4 统计学分析

统计数据时使用(SPSS25.0)软件进行数据分析，使用($\bar{x} \pm s$)统计病患资料，使用(%)表示计数资料、例数，采用t, X²对临床数据进行检测；如果(P<0.05)时，组间差异存在统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者满意度对比

两组病患满意度情况比较，研究组满意度(97.29%)比较对照组满意度(81.08%)，对照组护理满意度较少，P<0.05。详情见表1。

表1 两组病患护理满意度对比[n(%), 例]

组别	n	非常满意	较为满意	基本不满意	总满意度
研究组	37	25	11	1	97.29
对照组	37	20	10	7	81.08
X ² 值	-	-	-	-	5.0455
P值	-	-	-	-	0.0246

2.2 两组病患不良反应对比

两组病患不良反应发生情况对比，不良反应情况分别为(8.10%)、(27.02%)，研究组不良反应较少，P<0.05。详情见表2。

表2 两组病患不良反应情况对比[n(%), 例]

组别	n	不良反应情况			总发生率
		血压升高	心律不齐	激素激增	
研究组	37	2	1	0	8.10
对照组	37	4	4	2	27.02
X ² 值	-	-	-	-	4.5725
P值	-	-	-	-	0.0324

3 讨论

手术室内是提供抢救、治疗的工作场所，该科室内日常护理服务极具繁杂、紧张、忙碌等，因此实施护理服务时具有一定难度、专业性，同时手术护理干预，能够直观影响到临床护理效果，对于患者症状康复情况极为重要。随着近年来医疗科技的不断发展，人们对护理工作的需求同时不断提高。常规护理服务已经无法满足手术室内护理工作，无缝隙护理服务，为近年来全新衍生的护理服务，该项服务在手术室护理工作中适用性极广，临床护理期间，能够全方位予以患者护理干预，提高临床护理质量，保障病患身心健康，提高其康复效果。两组患者满意度情况对比，满意度情况分别为(81.08%)、(97.29%)，对照组护理满意度较差；两组不良反应情况对比，不良反应分别为(8.10%)、(27.02%)，对照组不良反应较多，(P<0.05)。

综上所述，手术室护理期间予以无缝隙护理服务，能够显著提高其护理效果，降低不良反应情况，能够有效提升护理安全性，值得临床广泛推荐使用。

参考文献

- [1]景芳,刘亚玲.全程无缝隙护理对手术室患儿术后疼痛及家属满意度的影响[J].临床医学研究与实践,2022,7(10):167-169.
- [2]龙玲,高颖.全程无缝隙护理干预在手术室护理中的效果评价[J].基层医学论坛,2022,26(09):123-125.
- [3]李伟珍,胡婉梅,成晓花,黄文斌.全程无缝隙护理干预模式对手术室护理质量的影响[J].中西医结合护理(中英文),2021,7(10):175-177.