大疱性皮肤病急性期住院患者的护理策略研究

黄昌娇

(广西钦州市第二人民医院皮肤科 广西钦州 535000)

【摘要】目的:探讨对于临床大疱性皮肤病急性期住院患者,采取舒适护理策略,研究评价其价值。方法:筛选在2023年1月-2024年12月我院就诊的46例临床大疱性皮肤病急性期住院患者作为本观察护理对象,依照随机数字表法分为2组,一个小组为对照组、一小组为观察组,分别对应落实常规、舒适护理,23例/组;对比两组之间的症状改善情况、心理情绪、舒适度、护理依从性。结果:观察组经干预后获取的症状消失时间、皮损愈合时间均更短($P<0.05$)。在实施护理策略后,观察组的焦虑情绪、抑郁情绪评分值更低,其舒适度评分值更高($P<0.05$)。观察组在内住院患者的护理依从性更高($P<0.05$)。结论:对于临床大疱性皮肤病急性期住院患者,采取舒适护理策略,可改善患者症状,缓解负性情绪,提高舒适度和护理依从性。

【关键词】大疱性皮肤病;急性期;舒适护理策略

Study on Nursing Strategies for Acute Phase Hospitalized Patients with Bullous Skin Disease

Huang Changjiao

(Department of Dermatology, Qinzhou Second People's Hospital, Guangxi Qinzhou 535000)

[Abstract] Objective: To explore the implementation of comfort-oriented nursing strategies for hospitalized patients with acute phase bullous skin disease and evaluate their clinical value. Methods: A total of 46 hospitalized patients with acute phase bullous skin disease were selected from January 2023 to December 2024 at our hospital. Using a randomized digital table method, they were divided into two groups: a control group (23 cases) and an observation group (23 cases), each receiving either standard care or comfort-oriented care. The intervention effects were compared in terms of symptom improvement, psychological well-being, comfort levels, and nursing compliance. Results: Intervention significantly shortened both symptom resolution time and lesion healing duration in the observation group ($P<0.05$). Post-intervention, the observation group demonstrated lower anxiety and depression scores along with higher comfort ratings ($P<0.05$). Additionally, the observation group exhibited better nursing compliance ($P<0.05$). Conclusion: Implementing comfort-oriented nursing strategies for acute phase bullous skin disease patients can effectively alleviate symptoms, reduce negative emotions, enhance comfort levels, and improve nursing adherence.

[Key words] Bullous skin disease; Acute phase; Comfort-oriented nursing strategy

前言

大疱性皮肤病,一种以大疱(直径超过0.5厘米)为主要病变的皮肤病,主要症状是在正常的皮肤或红斑上有大疱、糜烂、结痂等,其创面易感染,多见于全身大面积糜烂、体液流失、营养不良、免疫功能低下等,再加上应用大剂量糖皮质激素、免疫抑制剂等^[1]。在急性期,患者常常面临剧烈的疼痛、瘙痒和感染风险,因此采取有效的护理策略至关重要。为了降低大疱性皮肤病对患者的日常生活造成的影响,降低身体和精神上的痛苦,除了药物治疗之外,还可以进行舒适护理干预,加速皮损的恢复,并使临床症状得到缓解^[2]。为此,本文筛选在2023年1月-2024年12月我院就诊的46例临床大疱性皮肤病急性期住院患者作为本观察护理对象,探究采取舒适护理策略的意义。详情如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

筛选在2023年1月-2024年12月我院就诊的46例临床大疱性皮肤病急性期住院患者作为本观察护理对象,依照随机数字表法分为2组,一个小组为对照组、一小组为观察组23例/组。对照组资料显示:男性20例、女性3例,年龄27-82岁,均值57.45,标准差为14.56。观察组:男性18例、女性5例,年龄27-80岁,均值57.66,标准差为14.79。各自分组之间的信息类比($P>0.05$)。此次研究获取医学伦理委员会审批。

1.2 纳入和排除标准

纳入标准:①确诊为大疱性皮肤病(如广泛水疱、糜烂面等),并且处于急性发作期;②需要住院治疗,并接受相

关护理；③患者或其法定代理人愿意参与研究，并签署知情同意书；④对护理干预有良好的耐受性。

排除标准：①妊娠或正在哺乳的女性患者；②患者有严重的精神障碍或认知功能障碍；③有其他类型的严重皮肤疾病；④在过去三个月内参与过其他临床试验的患者；⑤资料不全。

1.3 方法

对照组，常规护理，即：保证患者处于空气清新、温度适宜、通风良好的环境，加强卫生管理，保持口腔和皮肤清洁，做好皮损的保护工作，避免受到压迫、刺激和污染，并在维持治疗过程中，对药物的选择、方法及用量给予指导，实施基础心理安慰。

观察组，舒适护理，即：(1)创面处理：保持清洁，使用无菌生理盐水或专用清洗液轻柔冲洗创面，避免摩擦和刺激；除非医嘱，避免人为破坏水疱，以减少感染风险；必要时由专业医护人员进行处理；使用无菌敷料（如无菌纱布、硅胶敷料等）覆盖创面，吸收渗出物；定期更换敷料，确保无污染，换药操作应在无菌条件下进行，手部消毒充分。(2)感染预防：护理人员严格遵守手消毒流程（洗手或酒精消毒），患者及家属也应加强手部卫生，根据感染风险采取相应隔离措施，避免交叉感染；同时密切观察有无发热、红肿、脓液等感染迹象，出现感染迹象及时报告医师，调整治疗方案。(3)疼痛管理：对于严重疼痛，可考虑遵医嘱给予非甾体抗炎药、镇痛剂或局部麻醉药，但须严格监控。对于轻度疼痛，则可保持创面湿润，减少疼痛和促进愈合，避免刺激性强的敷料或药物，采取听音乐、看书等方式转移患者注意力，安抚患者情绪，减少焦虑，有助于减轻疼痛。(4)心理护理：要重视患者的情绪，取得患者的信赖，建立和谐的护患关系。在护士的引导下，患者敞开心扉，说出自己的想法，护理人员仔细地聆听患者的主诉，对肢体动作、表情进行细致的观察，从而对情绪状况做出准确判断；耐心地听患者说出自己的心事，疏导情绪，解答了患者的疑问，用目光接触、触摸等方法，鼓励、安慰患者。(5)生活管理：告知患者在日常的生活中，应穿着宽松的衣服、床单、被褥等，以柔软、光滑的材料为宜，尽量避免对病变部位的摩擦、刺激，勤修指甲，避免用手直接触摸病变部位；如果出现瘙痒，可以通

过听音乐、看书、聊天来转移注意力，减轻不适。在日常生活中要多吃一些高热量和高蛋白的食物，有助于病情的恢复；尊重个人偏好，保证食物适合口味，提供足够的营养和能量，同时也能使情绪得到提高。

1.4 观察指标

(1) 统计各自分组之间的症状改善情况，包含了症状消失时间、皮损愈合时间。

(2) 心理情绪、舒适度的对比：在护理策略实施前后，对患者展开评估，利用焦虑(SAS)、抑郁(SDS)自评量表进行，界定值对应 50、53 分，分值越高则表示负性心理情绪越严重；采取舒适度量表(GCQ)，分值在 30-120 分，得分越高则表示患者越舒适。

(3) 护理依从性对比：自制问卷，设置分值 0-100，>90 分定义完全依从，<60 分定义不依从，60-90 分定义部分依从。

1.5 统计学方法

本次研究相关信息则借助 SPSS26.0 分析，计数资料，比如护理依从性数据，经(%)表述，以 χ^2 检验，计量资料，比如症状改善情况、心理情绪、舒适度信息，则需通过 $(\bar{x} \pm s)$ 表示，并施行 t 检验， $P < 0.05$ ，象征了组间数据对比显示，差异有统计学意义。

2 结果

2.1 症状改善情况

观察组经干预后获取的症状消失时间、皮损愈合时间分别为 (7.02 ± 1.32) d、 (6.73 ± 1.11) d，对照组对应为 (11.12 ± 2.03) d、 (10.47 ± 1.99) d，显示观察组用时更短 ($P < 0.05$)。

2.2 心理情绪、舒适度

实施护理策略后，观察组的焦虑情绪、抑郁情绪评分值更低，其舒适度评分值更高 ($P < 0.05$)。详细参见表 1。

2.3 护理依从性

观察组在内住院患者的护理依从性更高 ($P < 0.05$)。详细参见表 2。

表 1 心理情绪、舒适度 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	SAS		SDS		GCQ	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	23	58.43 ± 4.65	38.54 ± 4.57	56.96 ± 4.11	37.34 ± 3.67	78.05 ± 6.43	107.87 ± 6.32
对照组	23	58.21 ± 4.37	42.09 ± 4.21	57.02 ± 4.35	40.91 ± 3.83	77.69 ± 6.12	101.56 ± 5.67
t	-	0.218	3.613	0.063	4.257	0.256	4.700
P	-	0.828	0.001	0.950	0.000	0.798	0.000

表2 护理依从性[n (%)]

组别	例数	完全依从	部分依从	不依从	总依从率
观察组	23	18 (78.26)	3 (13.04)	2 (8.70)	21 (91.30)
对照组	23	10 (43.48)	7 (30.43)	6 (26.09)	17 (73.91)
X ²	-	-	-	-	4.114
P	-	-	-	-	0.043

3 讨论

大疱性皮肤病,是一种慢性、复发性疾病,也是一种严重危害人类健康的自身免疫性疾病,具有病程长、易复发、死亡率高、治疗周期长、治疗成本高等特点^[3-4]。好发人群以中老年人为主,随着年龄的增长和医疗水平的不断提升,发病率也在不断地增加。在治疗过程中,极易导致全身营养不足,出现多种并发症,不仅严重影响患者的生活质量,而且还会导致身心俱疲,严重时甚至会有生命危险^[5]。所以,选择一个合适的、高效的护理方法非常关键,可以取得更好的效果。

在临床上,最常见的护理方案是传统护理,虽然起到了一些作用,但实施起来并不令人满意^[6]。实施舒适护理干预,可以改善护理品质,在执行过程中,可以对传统的例行治疗进行补充,并保持其优点。舒适护理干预,是以患者的身体和心理需要为基础,以舒适度、优质、有效为基本准则,以患者为中心,提供科学、合理的护理服务,并在多个方面进行护理干预,使护理工作更加舒适,从而提升了治疗的效率和质量^[7]。

在本次研究中,通过对对照组引入常规护理,观察组引入舒适护理,显然观察组占据优越性。主要数据分析发现:观察组的症状消失时间和皮损愈合时间明显短于对照组,提示舒适护理可改善患者症状,缩短症状消失时间和皮损愈合时间。在干预后,观察组患者的焦虑和抑郁情绪评分低于对

照组,舒适度评分显著更高,说明舒适护理有助于缓解负面情绪,提升了患者的整体体验。观察组的护理依从性更高,说明舒适护理促进患者配合治疗和护理计划。分析在于,在实施舒适护理期间,通过规范、科学的创面护理有助于保持创面清洁、湿润,防止二次损伤,加速组织修复;同时大疱性皮肤病患者皮肤屏障受损,极易继发细菌、真菌感染,严格的无菌操作和环境管理能有效预防感染,减少感染带来的干扰,有助于基础疾病的控制和治疗。疼痛,是大疱性皮肤病急性期最显著的症状之一,有效镇痛措施提升患者舒适度,减轻疼痛能增强患者对护理和治疗的依从性。患者因病情严重及外观改变常感焦虑、抑郁,心理护理帮助疏导情绪,提升心理承受能力,良好的心理状态促进病情恢复,提高患者生活满意度。同时,协助患者完成饮食、排泄、休息等基本生活活动,避免因行动不便引发并发症。可见,舒适护理通过多方面综合干预,不仅能有效促进大疱性皮肤病急性期患者的身体康复,还能减轻其心理负担,提升整体护理质量和治疗效果,从而为患者创造一个安全、温馨、支持的住院环境,这对于缩短病程、降低并发症发生率及提高患者生活质量具有重要意义。

综上所述,采用舒适护理策略在我院大疱性皮肤病急性期患者中具有明显优势,不仅加速了症状的缓解和皮损的愈合,还改善了患者的心理状态,提高护理依从性,建议在临床实践中推广舒适护理,以提升治疗效果与患者满意度。

参考文献:

- [1]王晓晓,曾彬,郭晶,等.三黄散软膏对自身免疫性大疱性皮肤病创面愈合作用的研究[J].现代医药卫生,2020,36(6):810-811815.
- [2]赵英,邵芬,石菊芳.舒适护理干预在大疱性皮肤病护理中的应用探究[J].当代临床医刊,2022,35(1):112-113.
- [3]袁丽娜,吴建,周萍.复方紫草油对大疱性皮肤病糜烂面继发感染干预的研究[J].深圳中西医结合杂志,2023,33(22):12-15.
- [4]徐珍珍,郑艳,刘俊杰.抗桥粒芯蛋白1、3抗体及大疱性类天疱疮180、230抗体联合检测诊断大疱性皮肤病的应用价值[J].分子诊断与治疗杂志,2024,16(3):416-420.
- [5]武玉娟,赵雅楠,陈显侠,等.整体护理模式在大疱性皮肤病中的应用价值[J].甘肃医药,2023,42(12):1123-1125.
- [6]王冬雪.舒适护理干预在大疱性皮肤病护理中的应用探究[J].临床护理进展,2022,1(1):00-23.
- [7]李彩娥,姚娟.大疱性皮肤病护理中舒适护理干预的应用研究[J].现代消化及介入诊疗,2022(S01):1414-1414.